


# SCALE DI VALUTAZIONE DEL DOLORE IN PRONTO SOCCORSO

## NEONATO E BAMBINO IN ETÀ PRE-VERBALE AL DI SOTTO DEI 3 ANNI: SCALA FLACC

CATEGORIA	PUNTEGGIO		
	0	1	2
Volto	Espressione neutra o sorriso	Smorfie occasionali o sopracciglia corrugate, espressione distaccata, disinteressata	Da frequente a costante aggrottamento delle sopracciglia, bocca serrata, tremore del mento
Gambe	Posizione normale o rilassata	Si agita, è irrequieto, teso	Scalcia, o raddrizza le gambe
Attività	Posizione quieta, normale, si muove in modo naturale	Si contorce, si dondola avanti e indietro, teso	Inarcato, rigido o si muove a scatti
Pianto	Assenza di pianto (durante la veglia o durante il sonno)	Geme o piagnucola, lamenti occasionali	Piange in modo continuo, urla o singhiozza, lamenti frequenti
Consolabilità	Soddisfatto, rilassato	È rassicurato dal contatto occasionale, dall'abbraccio o dal tono della voce, è distraibile	Difficile da consolare o confortare

## Bambino di età > 3 anni: scala di Wong-Baker



## Bambino di età ≥ 8 anni: scala numerica



## BIBLIOGRAFIA

Il dolore nel bambino: Strumenti pratici di valutazione e terapia. Ministero della Salute. Guido Fanelli, Franca Benini et al. 2010.