

IL BAMBINO MALTRATTATO

A cura dell'infermiera Francesca Romana Rapaccini

Gemelli



Gennaio '19

**Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Università Cattolica del Sacro Cuore**

Per abuso all'infanzia e maltrattamento devono intendersi “tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente che comportino un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo e alla dignità del minore”



VENGONO DISTINTI VARI TIPI DI ABUSO

Abuso fisico

Abuso sessuale

Abuso psicologico

Patologie delle cure



- **abuso fisico : 40% dei casi di abuso**
- **12-14 aa : più abusati fisicamente**
- **< 2 aa : meno frequenti ma più gravi**
- **< 3 aa : 10% sono traumi**
- **spesso sono abusi ripetuti**

Il sospetto e/o la diagnosi di maltrattamento avvengono attraverso un percorso seguito da più figure professionali che collaborino tra loro.

TRIAGE

ANAMNESI

Porre attenzione all'atteggiamento del bambino e del genitore e alla modalità in cui avviene il racconto dell'accaduto

VALUTAZIONE ALLA PORTA ED ESAME OBIETTIVO

Fare l'ABC e osservare attentamente il paziente dal punto di vista comportamentale e psicologico. In caso di sospetto risulta fondamentale individuare alcuni segni di maltrattamento. Il dialogo con il genitore e/o l'accompagnatore deve avvenire senza mai far trapelare insinuazioni. Esaminare eventuali lesioni recenti e meno recenti.

I **SEGNI** che più comunemente accendono la spia su un sospetto abuso possono essere vari:

- Un particolare atteggiamento da parte del genitore
- Segni di schiacci e morsi
- Ematomi ed ecchimosi, di solito in sedi come tronco o glutei (insolite localizzazioni se il trauma è avvenuto giocando o facendo sport)
- Ustioni: le lesioni appaiono insolite sia per forma (lesione netta, circolare, a forma di guanto/calza agli arti superiori e/o inferiori) che per la regione ove si presentano (dorso della mano, pianta dei piedi, glutei o schiena, genitali)
- Lesioni in regione orale e/o genitale
- Fratture sospette

FRATTURE

- Nei bambini al di sotto dei 18 mesi di vita solitamente si presentano multiple ,in diverso stato di riparazione
- Nei bambini più grandi si ritrovano maggiormente nelle metafisi-epifisaria delle ossa lunghe
- Fratture costali multiple e bilaterali

SHAKEN BABY SINDROME

Con il termine di shaken baby syndrome (SBS) si indica una grave forma di abuso sul bambino che rappresenta un'importante causa di mortalità e disabilità in età pediatrica. La sindrome generalmente si osserva in bambini di età inferiore a 1 anno quando un genitore o chi si prende cura del piccolo prova a farlo smettere di piangere scuotendolo energicamente. Le ripetute oscillazioni con accelerazione rotazionale della testa sono responsabili di danni a carico delle strutture vascolari e nervose.

Le lesioni più frequentemente sono rappresentate da danno cerebrale, emorragie retiniche ed emorragia subdurale. Fratture a carico di vertebre, ossa lunghe e costole possono essere associate alla sindrome.

TRIAGE

Già nella fase di triage è possibile compiere delle accortezze necessarie alle fasi successive:

- evitare di far lavare il paziente
- raccogliere eventuali indumenti
- allontanarlo se possibile e se necessario dagli accompagnatori
- evitare di far bere e/o mangiare il paziente

CODICE COLORE

CODICE ROSSO

Riferita o conclamata violenza sessuale o maltrattamento con evidenti segni di percosse o abuso

CODICE GIALLO

sospetta violenza sessuale o maltrattamento